



Women Help Women



Aborsi Aman Dengan Misoprostol Aman digunakan sebelum 9 minggu kehamilan



Pertama:

Jangan dilakukan sendirian! Mintalah seseorang untuk menemani anda, andaikan anda harus pergi ke rumah sakit.





Kedua:

Letakkan 4 tablet Misoprostol dibawah lidah selama 30 menit.




Ketiga:

Tiga jam kemudian, letakkan 4 tablet Misoprostol dibawah lidah selama 30 menit.



Ke empat:

Tiga jam kemudian, letakkan 4 tablet Misoprostol dibawah lidah selama 30 menit.



Apa yang akan terjadi saat aborsi berlangsung?



Kram
+
Perdarahan



Efek samping apa yang akan saya alami karena penggunaan Misoprostol?




Diare



Muntah



Demam




Sakit Kepala



Bagaimana saya tahu kapan harus ke rumah sakit?



Perdarahan Berat:
Lebih dari 2 pembalut per jam
Selama lebih dari 2 jam



Demam Tinggi:
Demam lebih dari 38⁰ atau 38⁰
selama lebih dari 24 jam



Nyeri Ekstrim:
Selama lebih dari
beberapa jam

Anda membutuhkan bantuan? Silakan hubungi

www.womenhelp.org

Atau email kami di: info@womenhelp.org